

Taxon *Vitis vinifera* Modry Portugal

Název taxonu	Vitis vinifera Modry Portugal
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	'Modry Portugal' (MP)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Blauer Portugieser, Oporto, Oporto Kék
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původ i křížení je nejasné, nebylo potvrzeno, že pochází z Portugalska

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je silné, hořčicově hnědé
Pupeny	malé, špičaté
Listy	středně velké, mělce tří až pětilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, většinou lehce překrytý; povrch listu je světle zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý hrozen, středně hustý, křídlatý; bobule je středně velká, kulatá, modročerné barvy
Semena	středně velká, hruškovitá až elipsoidní, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytřvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	Kober 5 BB, na úrodných půdách SO 4 a Teleki 5 C, na vápenných půdách Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	náchylná k houbovým chorobám, poškozována obaleči
Plodnost	ranější až střední pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy	klon KA 20/52
Popis vína	víno má nižší obsah tříslovin, rubínovou barvu, odrůdovou chuť ovocného charakteru
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 114)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

