

Taxon *Vitis vinifera* Portugal bílý

Název taxonu	Vitis vinifera Portugal bílý
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Portugalské bílé’ (PB)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Portugal bílý, Portugieser weiss, Portugieser grün, Beli Vranik
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší evropská odrůda, křížení není známo (spontánní křížení Portugalu nebo pupenová mutace z Portugalu modrého či šedého)

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světleji hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	malé, zahrocené
Listy	velké, trojlaločné s minimálními horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený, ve tvaru písmene V; povrch listu je světle zelený, lehce vráscitý, vespod hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitě-válcovitý, spíše řidší; bobule je kulatá, menší až středně velká, zelenožluté barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zahnutým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Modrý Portugal (PB však zraje dříve a má bílou barvu bobulí)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy spraše, písčitohlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň
Podnož na chudších půdách Kober 5 BB nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci odolnost k houbovým chorobám je nízká
Plodnost raná, pravidelná (výsos 8-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína víno je lehčího typu s nižší kyselinkou, bez výraznějšího aroma
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

