

Taxon *Androsace studiosorum*

Název taxonu	Androsace studiosorum
Vědecký název taxonu	Androsace studiosorum
Jména autorů, kteří taxon p...	Kress (1982)
Český název	pochybek prvosenkovitý
Synonyma (zahradnický pou..	Androsace primuloides Duby
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Androsace

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	západohimálajské horské masívy (Kumaon, Ladakh, Chamba, Nepal)

Zařazení

Fytcenologický původ	oreofyt / etalofyt, nomofyt - subalpinské křoviny a travnaté svahy mezi 2800 - 4200 m n.m.
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trvalka s výběžkatými, přezimujícími, dimorfními listovými růžicemi, za květu do 0.1 m vysoká
Kořen	adventivní kořeny ze zkrácených oddenků
Výhony	hnědočervené stolony s dceřnými růžicemi
Listy	dimorfní: přezimující drobné, obvejčité a hustě bělavě vlnatě chlupaté, jarní větší, elipčité kopinaté, bělavě pýřité
Květenství	okolíky až dvacetikvěté, pýřité a žláznatě chlupaté
Květy	aktinomorfní, různobalné, srostloplátečné, pětičetné s krátkými trubkami, sytě růžové, haplostemonické, homostylické
Plody	okrouhlé dvou- nebo třísemené tobočky otvírané apikálními zuby (bez okrasné hodnoty)
Semena	hrnatě vejčitá, hnědá
Možnost záměny taxonu (+..	často zaměňována s velmi podobnou <i>Androsace sarmentosa</i> Wall. (jarní listy olýsávající, odění hnědavé); ostatní pěstované druhy sekce <i>Chamaejasme</i> jsou drobnější a s monomorfními listovými růžicemi

Dlouhověkost	nepříliš dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody	mesofyt
Faktor půdy	organickými složkami bohaté, nezasolené půdy s pH 6.2-7.8
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná.. Choroby a škůdci	A2 so-abs; doplňkově St2 abs, FR2 so-abs (svěží půdy na slunci) rzi (Puccinia) a ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Aulacorthum, Aphis) a molice (Trialeurodes)
Doporučený spon pro výsad..	20-30 rostlin na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů a Množení šlahouny
Konečné hrnky	6-8 cm
Retardace	ne
Květní tvorba	exaktní data dosud málo známa, nutná je vernalizace
Odrůdy	lososově růžová 'Salmon' a bělokvětá 'Doksa' - nabízeny jen ojedinele

Ostatní

Odkazy

- Kress, A.: Eine "neue" Androsace-Art: Androsace studiosorum Kress, spec. nov. (Androsace primuloides). Phytologia 52 (1982) 255-256.



