

Taxon Vitis vinifera Aromina

Název taxonu	Vitis vinifera Aromina
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Aromína´ (Ar)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	TČVČBxIO 23/26
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Děvín´ x ´Irsai Oliver´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké až velké, okrouhlé, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, s průsvitem; povrch listu je mírně vrásčitý, ze spodní strany štětinatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, zelenožluté barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína či burčáku, přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, napadána hmyzem, sesychá třapina
Plodnost	velmi raná, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dává lehčí vína, příjemné muškátové chuti, s nižším obsahem kyselin
Doporučená technologie vína	burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 103)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

