

Taxon *Vitis vinifera* Aromina

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | Vitis vinifera Aromina |
| Vědecký název taxonu | Vitis vinifera |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Linné |
| Odrůda | ´Aromína´ (Ar) |
| Český název | Réva vinná pravá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | TČVČBxIO 23/26 |
| Autor | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | vinifera |
| Nadřazená kategorie | Vitis |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Kulturní původ |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Děvín´ x ´Irsai Oliver´ |

Zařazení

| | |
|----------------------|----------------|
| Fytcenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina | Mošťová odrůda |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------------|---|
| Habitus | dle vedení, má středně bujný až bujný růst |
| Výhony | jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyžrávající |
| Pupeny | středně velké, širší, tupé |
| Listy | středně velké až velké, okrouhlé, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, s průsvitem; povrch listu je mírně vrásčitý, ze spodní strany štětinatý |
| Květenství | lata |
| Květy | oboupohlavné, pětičetné |
| Opylovací poměry | Samosprašná |
| Plody | středně velký, kuželovitý, hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, zelenožluté barvy |
| Semena | středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem |
| Kůra a borka | šedé barvy, odlupuje se v pásech |
| Vytrvalost | ano |
| Dlouhověkost | ano |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení | Červen |

Doba zrání

| | |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Srpen |
| Konec doby zrání | Září |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění |
| Faktor tepla | teplé polohy, mrazuvzdornost střední až dobrá |
| Faktor vody | příliš suché půdy jsou méně vhodné |
| Faktor půdy | lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |
| Faktor půdy - poznámka | ovlivňujeme podnoží |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

| | |
|-----------------|--|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení |
| Řez | na dlouhý tažeň |
| Podnož | na chudších půdách Kober 125 AA nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C |

Užitné vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Použití | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína či burčáku, přímý konzum |
| Choroby a škůdci | středně odolná k houbovým chorobám, napadána hmyzem, sesychá třapina |
| Plodnost | velmi raná, pravidelná (výnos 10-15 t/ha) |

Množení

| | |
|-----------------------------|---|
| Množení | Roubování |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací |
| Popis vína | dává lehčí vína, příjemné muškátové chuti, s nižším obsahem kyselin |
| Doporučená technologie vína | burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée |

Celky sbírek

| | |
|--------------------------|---|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 103) |
|--------------------------|---|

Ostatní

| | |
|--------|---|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf |
|--------|---|

Grafické přílohy

