

Taxon *Sesleria autumnalis*

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | Sesleria autumnalis |
| Vědecký název taxonu | Sesleria autumnalis |
| Jména autorů, kteří taxon p... | (Scop.) F. W. Schultz |
| Český název | Pěchava podzimní |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Sesleria elongata Host |
| Autor | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Sesleria |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Holartická květenná říše a Mediterránní oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | od severovýchodní Itale po Albánii |

Zařazení

| | |
|---------------------|---|
| Pěstitelská skupina | Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená |
| Životní forma | Hemikryptofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|----------------------------|--|
| Habitus | pravidelné, řídké, spíše širší než vyšší , cca 30 cm vysoké |
| Kořen | svazčitý |
| Výhony | stébla vzpřímená, neolistěná, 50 cm dlouhá ukončena květenstvím |
| Listy | světle zelené až žlutozelené, 30 x 0,5 cm velké, drsné |
| Květenství | úzce válcovitý lichoklas, tvořený směstnanými klásky, je stříbřitě bílé barvy a přibližně 10 cm dlouhý |
| Květy | klásek |
| Možnost záměny taxonu (+.. | podobná s <i>S. heufleriana</i> - ta kvete v VI., květenství je černé barvy |
| Vytrvalost | vytrvalá |
| Dlouhověkost | velmi dlouhověká |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |
| Doba rašení - poznámka | počátkem dubna |

Doba kvetení

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Začátek doby kvetení | Srpen |
| Konec doby kvetení | Říjen |
| Doba kvetení - poznámka | pozdně kvetoucí druh |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|--|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | plné slunce, lehký polostín |
| Faktor tepla | v našich klimatických podmínkách zcela mrazuvzdorná |
| Faktor vody | upřednostňuje vlhká stanoviště ale je tolerantní k suchu |
| Faktor půdy | živné, kamenité, písčité i vápenité, propustné |
| Faktor půdy - poznámka | nemá vyhraněné pH, spíše neutrální až vápenité půdy |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez porost seřezeme na jaře

Užitné vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Období hlavního estetického... | v době kvetení |
| Použití - pro trvalky | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon |
| Doporučený spon pro výsad.. | 6 ks/ m2 |

Množení

| | |
|--------------------|-----------------|
| Množení | Dělení trsů |
| Množení - poznámka | dělením na jaře |

Ostatní

Odkazy

- KAISER, Klaus. Meist mit Kopfchen. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer. 2016, roč.42, č. 8, s. 8 - 15. ISSN 0341-2105.