Taxon Vitis vinifera Poloskei

Název taxonu	Vitis vinifera Poloskei
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Pölöskei muskotály´ (Pol)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	R-10
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Zalagyöngye´ x (´Gloria Hungariae´ x ´Královna Alžběta´)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	muškátová stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký, vespod velmi jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	má velký, kuželovitý, poměrně hustý hrozen; bobule je středně velká až velká, elipsovitě oválná, žlutozelené barvy
Semena	středně velká, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen

Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitě chruplavá, chuť je příjemně sladká s muškátovým aroma

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- V / ZF - V - vinice (řádek 125)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy