

# Taxon *Begonia manicata*

Název taxonu	Begonia manicata
Vědecký název taxonu	Begonia manicata
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Brongn. ex F. Cels (1842)</a>
Odrůda	´Aureomaculata´
Český název	kysala
Synonyma (zahradnický pou..	Begonia lepidota Liebm.; Gireoudia manicata (Brongn. ex F. Cels) Klotzsch; Begonia robustior Standl. & L.O. Williams
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Begonia</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mexiko, Guatemala

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Chamaefyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	vzpřímená stálezelená bylina vytvářející oddenky, výška 45-60 cm, šířka 30-35 cm
Výhony	vytváří oddenky
Listy	střídavé; asymetrické čepele oválné až vejčité, 12-15 x 8-12 cm, pilovité, se srdčitou bází a zvlněným ochlupeným okrajem, zelené a lesklé; listy dlouze řapíkaté; na rubu listové čepele (na žilnatině) a na řapíku vytváří výrazné ploché vínově červené chlupy, v místě nasedání čepele na řapík jsou chlupy v souvislých prstencích
Květenství	výrazné laty, vysoko nad listy
Květy	jednopohlavné, světle růžové květy o průměru 1,5 cm
Plody	3pouzdrá tobolka

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Březen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	rozptýlené světlo, polostín, ne na plné slunce
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník; teploty v létě 18-20 °C, v zimě nad 10 °C
Faktor vody	rovnoměrná zálivka, nesnáší přemokření; při teplém přezimování vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	doplňkový sortiment begónií do nádob; doplněk podrostů teplých skleníků
Choroby a škůdci	třásněnky při suchém vzduchu; kořenová a listová háďátka; pravé padlí v příliš mokřém substrátu

## Množení

---

Množení	Vegetativní, Listové řízky a Dělení trsů
Odrůdy	´Aureomaculata´ - žluté olejové skvrny na listové čepeli, která je světle zelená a lesklá; ´Crispa´ (syn. ´Cristata´) - hřebenité okraje listové čepele

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/3400203?tab=references>

## Grafické přílohy

---

