

Taxon *Vitis vinifera* Hibernal

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Hibernal
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Hibernal’ (Hi)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Geisenheim 322-58, Gm 322-58
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. <i>vinifera</i>
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	německá odrůda, vyšlechtěná v Geisenheimu vznikla křížením (‘Chancellor’ x ‘Ryzlink rýnský’ klon 239 Gm) F2 generace

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velké až velké, spíše celokrajné, s velmi mělkými horní výkroji, bazální výkroj tvaru písmene V, otevřený; povrch tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, hustý, kuželovitý hrozen (někdy u báze křídlatý); bobule malá, kulatá, červenošedá
Semena	menší, hruškovité, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano

Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	nevhodné jsou příliš suché půdy
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	všechny typy vedení
Řez	snáší dlouhý i krátký řez
Podnož	do humózních půd Amos či SO 4, do sušších CR 2, Kober 125 AA i 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	odolnějšík houbovým chorobám, citlivější k plísni révové v době květu
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má svěží kyseliny, kořenitě ovocnou vůni i chuť, broskvově kopřivovou až s tóny grepu či lipového květu
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 96, 97, 98\)](#)

Grafické přílohy

