

Taxon *Iris reticulata*

Název taxonu	<i>Iris reticulata</i>
Vědecký název taxonu	<i>Iris reticulata</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	M. Bieb.
Odrůda	‘Joyce’
Český název	kosatec síťkovaný
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Iridodictyum reticulatum</i> (M.Bieb.) Rodion.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael, Irák, Írán, Kavkaz. V Evropě se začal pěstovat již na začátku 19. století.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibulky se vysazují v říjnu do hloubky 5-8 cm na teplé slunné místo, půda musí být dobře propustná. V době vegetačního klidu vyžadují cibulky suché prostředí, ve vlhčích polohách a těžších půdách je vhodné cibulky v červnu vyjmout z půdy a do další výsadby je skladovat na suchém místě. V dobrých podmínkách mohou cibulky zůstat na stanovišti několik let. Vytvoří pak působivé trsy. Tyto druhy kosatců patří na jaře k prvním kvetoucím rostlinám v zahradě. Vysazují se tedy na dobře viditelná místa v blízkosti cest, na skalky a do trvalkových záhonů nebo do větších nádob.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Kořeny svazčité
Pupeny	Pupeny jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Listy tmavě zelené, ojíňené, čárkovité a dlouhé až 30 cm. Lista se začínají prodlužovat až po odkvětu.
Květy	Květy v odstínech modré a fialové barvy vykvétají v únoru až březnu a slabě voní.
Plody	Plodem je tobolka.

Vytřvalost	Na vhodných stanovištích dobře vytřvalý.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.
Doporučený spon pro výsad.	15 x 15 cm.

Množení

Množení - poznámka	Rostliny se množí dceřnými cibulkami.
Odrůdy	Dnes je v kultuře velké množství odrůd, lišících se především barvou a šířkou květních plátků, např. 'Joyce', 'Edward' s jasně modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích; 'Pauline', 'Purple Gem' s modrofialovými květy s bílým žíháním; 'Natascha' s květy bílými se žlutou skvrnou, 'Cantab', 'Marquerite' se světle modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích, 'J.S.Dijt' s tmavě fialovými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích; 'Gordon' s tmavě modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích a mnohé další. Pěstují se také odrůdy, vzniklé mezidruhovým křížením, např. 'Frank Elder', 'Katharine Hodgkin' či 'Sheila ann German' jejichž rodiči jsou <i>I. historioides</i> (G.F.Wilson) S.Am. 'Major' a <i>I. winogradowii</i> Fomin. Mají světle modré květy s výrazným modrým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích. Křížení mezi <i>I. historioides</i> (G.F.Wilson) S.Am. a <i>I. reticulata</i> M.Bieb. dalo vzniknout odrůdám 'Violet Beauty', 'George', 'Harmony'.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 31: štěrkový záhon / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O31: 'Joyce', J. S. Dijt'\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... D 10: 'J. S. Dijt' - podzim 2015 - jaro 2023 přesazený za skleník do štěrkového záhonku (O 31)

Dodavatel D 10: 'J. S. Dijt' - Jošt Import

Grafické přílohy



