

# Taxon *Vitis vinifera* Prachtraube

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu                   | <i>Vitis vinifera</i> Prachtraube       |
| Vědecký název taxonu           | <i>Vitis vinifera</i>                   |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ´Prachttraube´ (Pr)                     |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Prachtraube, Raisin superbe             |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ   |
| Biogeografické regiony - po.. | starší evropská odrůda vzniklá v Alsaském Colmaru, křížením odrůd ´Boskokisi (Boskolena)´ x ´Madlenka královská´ |

## Zařazení

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Fytcenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina  | Mošťová odrůda |
| Životní forma        | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Habitus                    | dle vedení, má středně bujný až bujný růst   |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, světle žlutavě hnědé, dobře vyžívající  |
| Pupeny                     | středně velké až velké, tupé   |
| Listy                      | středně velké, tři až pětilaločné, s velmi výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je puchýřnatý, vespod jemně plstnatý |
| Květenství                 | lata   |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné  |
| Opylovací poměry           | Samosprašná  |
| Plody                      | středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen s křídélky; bobule kulatá až elipsovitá, středně velká, zelenožlutá                                       |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem  |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech   |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ´Müller Thurgau´ (Prachttraube nemá tak hluboké listové výkroje)   |
| Vytrvalost                 | ano  |
| Dlouhověkost               | ano  |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)  |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

---

|                    |      |
|--------------------|------|
| Začátek doby zrání | Září |
| Konec doby zrání   | Září |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Faktor světla - slunce   | ✓  |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)        |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá |
| Faktor vody              | příliš vlhké, jílovité i suché písčité půdy jsou méně vhodné     |
| Faktor půdy              | nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy                           |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓  |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží  |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení  |
| Řez             | snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažních však více plodí  |
| Podnož          | pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 i T 5C |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Použití          | bílá moštová odrůda (dřívě i stolní) - výroba bílého vína, přímý konzum |
| Choroby a škůdci | střední odolnost k houbovým chorobám, citlivá k plísni šedé             |
| Plodnost         | ranější, pravidelná (výnos 7-12 t/ha)                                   |

## Množení

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Množení                     | Roubování  |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  |
| Popis vína                  | dužnina bobule je masitá až chruplavá, příjemně sladké chuti; víno je ovocné lehčí s jemnou kyselinkou |
| Doporučená technologie vína | burčák, stolní a jakostní vína   |

## Celky sbírek

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 132)</a></li></ul> |
|--------------------------|---|

## Ostatní

---

|        |   |
|--------|---|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|---|

Grafické přílohy

