

Taxon Vitis vinifera Cabanska perla

Název taxonu	Vitis vinifera Cabanska perla
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Čabaňská perla’ (ČP)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Čabaňa, Csabagyöngye, Perle von Csaba
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší maďarská odrůda, vznikla křížením ‘Madlenka raná’ x ‘Muscat Fleur d’Oranger’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, občas hůře vyzrávající
Pupeny	menší, tupé
Listy	malé až středně velké, okrouhlé, tři až pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je hladký, vespod lehce plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký hrozen, kuželovitý, středně hustý; bobule je malá, kulatá až mírně oválná, lehce ojíněná
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Augustovskij’ (Čab.perla má spodní stranu listu lehce plstnatou)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen
Konec doby zrání Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až nižší
Faktor vody méně vhodné jsou suché a štěrkovité půdy
Faktor půdy nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na tažně
Podnož pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože
Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, T 8B i CR 2

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda (dřívě i stolní) - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci nízká odolnost k houbovým chorobám, citlivá na mrazy, sprchává
Plodnost raná, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína bobule je masitá až chruplavá, sladká, příjemné muškátové chuti; víno je lehce muškátové s jemnou kyselinkou
Doporučená technologie vína burčák, stolní a jakostní vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

