

Taxon *Vitis vinifera* Regent

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | <i>Vitis vinifera</i> Regent |
| Vědecký název taxonu | <i>Vitis vinifera</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Linné |
| Odrůda | ‘Regent’ (Re) |
| Český název | Réva vinná pravá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Gf. 64-198-3, AD 6, Dajána |
| Autor | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | vinifera |
| Nadřazená kategorie | Vitis |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Kulturní původ |
| Biogeografické regiony - po.. | jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd (‘Sylvánské zelené’ x ‘Müller Thurgau’) x ‘Chambourcin’ |

Zařazení

| | |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina | Mošťová odrůda |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------------|---|
| Habitus | dle vedení, má středně bujný růst |
| Výhony | jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyžívající |
| Pupeny | středně velké, zašpičatělé |
| Listy | středně velké, spíše celokrajné s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je světleji zelený, slabě vrásčitý |
| Květenství | lata |
| Květy | oboupohlavné, pětičetné |
| Opylovací poměry | Samosprašná |
| Plody | malý, kuželovitě-válcovitý hrozen, středně hustý; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modrá |
| Semena | malá, hruškovitá, s krátkým zobáčkem |
| Kůra a borka | šedé barvy, odlupuje se v pásech |
| Vytrvalost | ano |
| Dlouhověkost | ano |

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy

Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy s dostatkem vláhy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení

Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez

Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či Börner, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína

Choroby a škůdci odolná k houbovým chorobám

Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 6-10 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno je jemné, s nižším obsahem tříslovin, výrazné barvy, odrůdové chuti ovocného charakteru

Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 1\)](#)

Grafické přílohy

