

Taxon *Sempervivum tectorum*

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | <i>Sempervivum tectorum</i> |
| Vědecký název taxonu | <i>Sempervivum tectorum</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | L. |
| Český název | netřesk střešní |
| Synonyma (zahradnický pou.. | <i>Sempervivum murale</i> Bor., <i>Sempervivum royanum</i> Corr. |
| Autor | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | subsp. <i>tectorum</i> |
| Nadřazená kategorie | Sempervivum |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|---|
| Biogeografické regiony | Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Appeniny, Alpy, Pyreneje, druhotně téměř po celé Evropě |

Zařazení

| | |
|-------------------------------|--|
| Fytocenologický původ | oreofyt / petrofyt - skály, druhotně kamenné zídky apod. do montanního stupně |
| Pěstitelská skupina | Trvalka stálezelená |
| Životní forma | Chamaefyt |
| Životní forma - poznámka | sukulent |
| Zařazení podle původu, nár... | Di - divoce rostoucí trvalka |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------------|--|
| Habitus | robustní sukulentní listové růžice s dceřinými růžicemi na stolonech |
| Kořen | masitý |
| Výhony | sympodium - květní lodyhy 0.1-0.3 m, hustě listnaté, po odkvětu odumírající |
| Listy | spirálně sestavené v husté růžici, hrotnatě vejčité, ploché a masité, lysé s brvitými okraji, zpravidla s červenými špičkami |
| Květenství | hvězdčovitě rozbíhavé vijany |
| Květy | aktinomorfni, různobalné s žláznatými kalichy, volnoplátěčné, hvězdčovitě 12ti až 16tičetné (petaly brvité, růžově purpurové se zelenými středními pruhy), diplostemonické |
| Opylovací poměry | Samosprašná |
| Plody | hnědé měchýřky bez okrasné hodnoty |
| Semena | velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná |

| | |
|----------------------------|--|
| Možnost záměny taxonu (+.. | zaměnitelné s robustními červeně kvetoucími druhy typové sekce: <i>Sempervivum calcareum</i> Jord. (květy zelenobílé s červenými bázemi, šedozelené růžice), <i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb. (purpurové, bělavě lemované petaly) - vše ještě komplikováno množstvím hybridů |
| Dlouhověkost | dlouhověká (růžice jednoleté) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení | Červenec |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | plné slunce |
| Faktor tepla | mrazuvzdorná do -40°C (USDA) |
| Faktor vody | nenáročná |
| Faktor půdy | propustná, spíše zásaditá s vyšším podílem organické složky |

Užitné vlastnosti

| | |
|---------------------------------|--|
| Použití - pro trvalky | KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé homině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | skalky, suché zídky |
| Doporučený spon pro výsad.. | 16-24 rostlin na m ² |

Množení

| | |
|----------------|--|
| Množení | Dělení trsů a Množení šlahouny |
| Konečné hrnky | 8 cm |
| Retardace | ne |
| Doba kultivace | 20-30 týdnů |
| Odrůdy | odrůdy lišící se velikostí a probarvením listů od žlutozelených ('Royanum', 'Limelight') po purpurové ('Sunset', 'Atropurpleum') |

Ostatní

| | |
|----------------|---|
| VBN statistiky | <i>Sempervivum</i> tuinplanten: 2006 - 2 605 187 prodaných hrnků "overig" |
|----------------|---|

Odkazy

- Konop R. (1987): Netřesky. ČZS - ZO klubu skalničkářů, Praha;

Parnell J., Favarger C. (1990): Notes on *Sempervivum* L. and *Jovibarba* Opiz. *Botanical Journal of Linnean Society* 103 (3): 216-220; Šinko M., Uher J. (2012): *Rozchodníky a netřesky* 5: *Sempervivu*

Grafické přílohy







