

# Taxon *Ribes sanguineum*

Název taxonu	<i>Ribes sanguineum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ribes sanguineum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Pursh.</a>
Český název	meruzalka krvavá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ribes</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA) a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Severní Amerika

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí opadavý netmitý keř do 2 (-4) m
Výhony	netmité, letorosty žlutočervené, chlupaté
Pupeny	vstřícné
Listy	listy tmavě zelené, okrouhlé, 5-10 cm široké, 3-5laločnaté, laloky tupé, rub šedoplstnatý, řapíky 1-2 cm
Květenství	květy po 12-20 v řídkém nícím nebo odstálém hroznu, 5-10 cm
Květy	květy (krvavě) červené až narůžovělé, asi 12 mm
Plody	plody černé, modrobíle ojněné, až 1 cm široké bobule s vytrvalým kalichem

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓

Faktor tepla	oblast I-II, namrzá
Faktor vody	nechce extrémny
Faktor půdy	nenáročný

## **Užitné vlastnosti**

---

Období hlavního estetického...	IV-V - velmi atraktivní květem, léto - plod
Použití	velmi atraktivní v době květu, jako solitera i do skupin
Choroby a škůdci	mšice

## **Množení**

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	výsev semen přichází v úvahu jen u čistého druhu a to vyjimečně, většinou množíme řízky
Odrůdy	‘Albescens’ - květy bělavé nebo narůžověle bílé, ‘Cameum’ - květy bledě růžové v širokých hroznech