

Taxon *Prunus armeniaca* 'Leskora'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Leskora'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Leskora'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. USA, selekce v ČR

Zařazení

Fytocenologický původ poslední křížení byly genotypy 'C4R8T143' x 'C4R9T26'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus koruna vzpřímená, středně hustá
Květy velké jako 'Velkopavlovická', oválné, blizna nad prašníky
Opylovací poměry Částečně samosprašná
Plody středně velké (30-45 g), oválné, srdčité oranžové s malým červeným líčkem, středně šťavnaté, velmi dobré, aromatické

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní, 1 den po 'Velkopavlovická'

Doba zrání

Doba zrání - poznámka velmi raná odrůda, 17 dní před 'Velkopavlovická'

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vysoce odolná proti mrazům, vhodná do všech oblastí
Faktor půdy málo náročná na stanoviště

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení zákrsek, špičák s předčasným obrostem
Řez vyžaduje pravidelný letní a udržovací řez s cílem otevřít korunu

Podnož dle podmínek stanoviště lze použít všechny, vhodné myrobalán, zelená renklóda

Užitné vlastnosti

Použití	především přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná vůči hnědnutí listů a moniliové hnilobě
Růstové i jiné druhově spec..	středně silný až slabý růst
Plodnost	brzká, hojná, pravidelná (při přeplození nutná probírka)

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

