

Taxon *Callicarpa bodinieri*

Název taxonu	Callicarpa bodinieri
Vědecký název taxonu	Callicarpa bodinieri
Jména autorů, kteří taxon p...	H. Lév.
Odrůda	´Profusion´
Český název	krásnoplodka Bodinierova
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Verbenaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	původ kultivaru: Holandsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 1,5- 3 m, vzrůst široce vzpřímený
Výhony	letorosty jemně šupinkaté
Pupeny	protistojné
Listy	řapíky a květenství hustě hvězdovitě chlupatá; řapíky 5–20 mm dlouhé, čepel červeně žláznatá, naspodu téměř lysá nebo hvězdovitě plstnatá, svrchu pýřitá, 5–18 cm dlouhá, eliptická až vejčitá nebo kopinatá, zašpičatělá
Květenství	vrcholíky 20–45 mm široké
Květy	stopky mají kratší než 10 mm, stopky květů asi 1 mm, kalich hvězdovitě plstnatý, asi 1 mm, ušty tupě trojúhelné, koruna liláková nebo purpurová, asi 3 mm, hvězdovitě plstnatá, tyčinky asi 6 mm, prašníky eliptické, 1 mm, semeníky pýřité, vytvářejí se v paždí listů
Plody	plody fialové až purpurové, kulovité, 2–4 mm široké
Kůra a borka	purpurově-hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilná
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 6 (do - 24°C)
Faktor vody	vyšší půdní vlhkost, ne zamokřené - bujný růst, možnost namrzání, v suchých půdách sprchání
Faktor půdy	pH neutrální, avšak živné půdy
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez hluboký na jaře - pro podporu kvetení, po namrznutí

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... Použití	vegetační sezona okrasný keř - skupiny, solitera
---	---

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyztřelé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	Generativní množení je možné, ale potomstvo je variabilní, v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary druhu <i>Callicarpa</i> množení řízkováním. Možno i roubovat, popřípadě očkovat na původní druhy, ale je to méně častý způsob množení.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... Poznámka	2009 matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)
--	---