

Taxon *Prunus x yedoensis*

Název taxonu	Prunus x yedoensis
Vědecký název taxonu	Prunus × yedoensis
Jména autorů, kteří taxon p...	Matsum.
Český název	višeň jedoská
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	pěstována v Japonsku, snad hybridního původu

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom 10-15 m vysoký; koruna ploše kulovitá, deštníkovitá, větve šikmo vystoupavé
Výhony	lysé nebo slabě pýřité
Pupeny	červenohnědé, střídavé
Listy	elipčité až obvejčité, 6 - 12 cm dlouhé, někdy dvojité pilovité, zuby protažené do nitky, na rubových nervech a řapíku pýřité
Květenství	krátce stopkaté hrozny
Květy	bílé, poupě růžové, 30 - 35 mm v průměru; korunní plátky široce elipčité, rozštěpené, kališní plátky přitisklé ke korunce; číška válcovitá, chlupatá; po 5 - 6 květech v krátce stopkatých hroznech; slabě voní
Plody	dužnaté peckovice, kulaté, 1 cm velké, leskle černé, trpké
Kůra a borka	šedočerná s hnědými lenticelami, dlouho hladká; borka černá
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus subhirtella (korunní plátky elipčité, rozštěpené; číška džbánkovitá)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete v dubnu před olistěním

Nároky na stanoviště

Faktor světla	vhodné stanoviště je slunce až lehký stín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblasti I-II
Faktor vody	půdy středně vlhké až mírně suché
Faktor půdy	vyhledává hlubší propustné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického..	na podzim žlutozlaté až cihlově červené
Použití	solitéra, okraje skupin i stromořadí
Růstové i jiné druhově spec..	příkrásně bohatě kvete, odrůdy málo plodí nebo neplodí

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělků, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na <i>Prunus avium</i>
Odrůdy	‘Inversii’ - větve převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ‘Moerheimii’ - do 3 m výšky, koruna velmi široká; výhony převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ‘Shidare Yoshino’ - větve převislé s velmi dlouhými letorosty; květy čistě bílé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)