

Taxon *Salix cinerea*

Název taxonu	Salix cinerea
Vědecký název taxonu	Salix cinerea
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	vrba popelavá
Synonyma (zahradnický pou..	Caprea cinerea (L.)Opiz, Salix aquatica Sm.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salix

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, kromě západní části, západní Sibiř, střední Asie, východně až do Altaje

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bočníkovitý až polokulovitý keř 2-3 (5) m vysoký
Výhony	letorosty i dvouleté větévkykrátce šedavě chlupaté
Pupeny	střídavé, šedavě chlupaté
Listy	listy podlouhle obvejčité až obkopynaté, 6-9 cm dlouhé, 2-3 cm široké, vroubkovaně pilovité až celokrajné, na líci matně zelené a olysalé, na rubu šedavě chlupaté, se 6-10 páry žilek, řapík 0,4-0,8 cm dlouhý, palisty velké, polosrdčité až ledvinité, vytrvalé
Květenství	jehnědy elipsoidní až válcovité, 2-4 cm dlouhé, s několika opadavými listy na bázi
Květy	květní listeny hnědočerné, dlouze chlupaté
Plody	tobolky
Kůra a borka	výrazné lišty

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete před olistěním

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	vlhké půdy
Faktor půdy	propustné půdy, nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	III-IV - jehnědy
Použití	málo běžný, krajinné úpravy

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	rozmnožování semenem se téměř neprovádí, nejčastější je množení dřevitými nebo bylinnými řízky