

# Taxon *Aconitum carmichaeli*

Název taxonu	<i>Aconitum carmichaeli</i>
Vědecký název taxonu	<i>Aconitum carmichaelii</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Debx.</a>
Český název	oměj Carmichelův
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Aconitum fischeri</i> Forb.et Hemsel.non Rchb.
Autor	Věra Žďárská (v_ra_rsk_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Aconitum</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mongolsko, Korea, Čína, Kamčatka

## Zařazení

Fytopcenologický původ	okraje lesních porostů, travnaté stráně, od nížin do 200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující a Léčivá a kořeninová rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, trsnatá trvalka výšky kolem 80 - 150 (200) cm
Kořen	kořenová hlíza tmavě hnědé barvy a kónického tvaru
Výhony	vzpřímené, řídce chlupaté, spoře větvené
Listy	střídavé, kožovité, dlanitodílné až dlanitosečné, okrouhlé, 3 dílné 6-11 x 9-15 cm velké, na líci řídce přitiskle chlupaté, na rubu řídce chlupaté.
Květenství	vrcholový hrozen válcovitého tvaru 10-25 cm dlouhý, hustý, mnohokvětý
Květy	fialově modrý, horní okvětní plátek přilbicový s krátkým zobákem, asi 2-3 cm dlouhý, postřanní šikmo vejčité a dolní eliptické; dva korunní lístky jsou přeměněné v dlouze stopkaté, krátké ostruhové medníky pod přilbicí
Plody	mnohosemenný měchýřek
Semena	křídlatá, trojhranná
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	středně dlouhověká

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Září
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	cenná pro pozdní aspekt ve výsadbách a intenzivní modrou barvu

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	při dostatku vody snáší i plné slunce, nenáročná
Faktor tepla	středně náročná
Faktor půdy	půdy humózní

## Užité vlastnosti

---

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	v záhonu na adekvátním stanovišti
Použití	světlé podrosty, okraje porostů, přistíněné záhony, k vodě, řez - floristika, léčivá rostlina
Růstové i jiné druhově spec..	dlouhé lodyhy natolik pevné, že nevyžadují oporu; podzimní vybarvování do žluta, celá rostlina prudce jedovatá - práce v rukavicích; k plnému vyvinutí potřebuje čas, přesazování co nejméně.
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m <sup>2</sup>

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby
Odrůdy	'Andersii' (křížení A. carmichaelii a A. carmichaelii var. wilsonii) - cca 120 cm, 'Clody' - 60 - 80 cm, jemně bíle světle modrý květ,

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(v západní části odrostu\)](#)
- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(sortiment LAKR na záhonu\)](#)
- [Labyrint zahrad / Unspecified \(stinná zahrada\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	A1: 'Arendsii' - XI/2017, Labyrint zahrad: 'Clody' - VI/2023
Dodavatel	A1 : 'Arendsii' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi Labyrint zahrad: 'Clody' - Trvalky Semanín

## Grafické přílohy

---





