

Taxon *Vitis vinifera* Talisman

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | Vitis vinifera Talisman |
| Vědecký název taxonu | Vitis vinifera |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Linné |
| Odrůda | ´Talisman´ (Ta) |
| Český název | Réva vinná pravá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Keša 1 |
| Autor | Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | vinifera |
| Nadřazená kategorie | Vitis |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|---|
| Biogeografické regiony | Kulturní původ |
| Biogeografické regiony - po.. | jde o ruskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Frumoasa albe´ x ´Vostorg´ |

Zařazení

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fytcenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina | Liána opadavá |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní odrůda révy |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------------|--|
| Habitus | má středně bujný až bujný růst |
| Výhony | jednoleté réví je středně silné až silné, světle hnědé, dobře vyzrávajících |
| Pupeny | středně velké, širší, tupé |
| Listy | velké, pěti i více laločnaté s výraznými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrásčitý, vespod mírně plstnatý |
| Květenství | lata |
| Květy | oboupohlavné, pětičetné |
| Opylovací poměry | Samosprašná |
| Plody | velký, kuželovitý, středně hustý až volný hrozen; bobule je velmi velká, mírně oválná, zelenožluté barvy |
| Semena | velká, s delším zobáčkem |
| Kůra a borka | šedé barvy, odlupuje se v pásech |
| Vytrvalost | ano |
| Dlouhověkost | ano |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá |
| Faktor vody | suché písčité půdy jsou nevhodné |
| Faktor půdy | hlinité či hlinitopísčité půdy |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |
| Faktor půdy - poznámka | ovlivňujeme podnoží |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

| | |
|-----------------|--|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení |
| Řez | na dlouhý tažeň |
| Podnoží | na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4 |

Užitné vlastnosti

| | |
|------------------|---|
| Použití | stolní odrůda - přímý konzum |
| Choroby a škůdci | odolnější k houbovým chorobám, sprchává (má samičí květy) |
| Plodnost | pozdní, pravidelná (výnos 5-9 t/ha) |

Množení

| | |
|--------------------|---|
| Množení | Roubování |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací |
| Popis vína | dužnina bobule je masitá, v ústech rozplývavá, neutrální chuť |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133, 93\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

