

Taxon **Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'**

Název taxonu	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'
Vědecký název taxonu	Physocarpus opulifolius
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Maxim.
Odrůda	'Dart's Gold'
Český název	tavola kalinolistá
Synonyma (zahradnicky pou..	Spiraea opulifolia
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Physocarpus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Pôvod kultivaru: byl uveden na trh v roce 1969, USA

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, středně až bujně rostoucí, rozložitý keř, dosahuje v 10 letech výšky 1,5 až 2,0 m, ve 20 letech výšky 2,0 až 2,5 m
Výhony	hnědé s popraskanou odlupující se borkou, letorosty lysé
Listy	při rašení svítivě žluté, později zeleno-žluté, střídavé, většinou trojlaločné, podobné kalině obecné, délka 5 - 7 cm
Květenství	polokulovitý okolík
Květy	12 mm široké, bílé, často bledě růžové
Plody	kožovité měchýřky, po 3-5, celé lysé, na bázi srostlé, červenavé, puchýřnatě nafouklé, 6-10 mm délka
Kůra a borka	odlupující se

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu listy málo vybarvují do žluta
Faktor tepla	Zóna 3 (do - 40 °C), plně otužilý keř
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách
Faktor půdy	na půdy nenáročný, pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	nevysazovat na silně vápenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez odstraňování slabých výhonů, při bujném růstu provádíme radikální zmlazení - řez silných větví u země

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... v průběhu vegetace
 Použití okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
 Množení - poznámka běžně se kultivar množí bylinnými, a dřevitými řízkami, doporučuje se použít rovněž stimulant o 1000 ppm IBA v roztoku, nebo o koncentraci 3000 ppm IBA v talku

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2008

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,](#)
- [C. G. Davidson,](#)