

Taxon *Muscari botryoides*

Název taxonu	Muscari botryoides
Vědecký název taxonu	Muscari botryoides
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Mill.
Odrůda	´Album´
Český název	modřelec
Synonyma (zahradnický pou..	Hyacinthus botryoides L.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Muscari

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Evropa - Itálie, Francie, Německo, Polsko, Řecko, Balkán, Ukrajina

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Druh je značně tolerantní k pěstebním podmínkám. Daří se jim na slunci i v polostínu. V době vegetace vyžadují dostatek vláhy. Cibule se vysazují v září a v říjnu do hloubky cca 10 cm a na jednom stanovišti mohou zůstat mnoho let. Z půdy se mohou vyjmout po ukončení vegetace v červnu a červenci a do další výsadby se skladují v teplém suchém prostředí.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Z kulovité cibule světlé barvy kryté tmavě hnědou slupkou vyrůstají úzké trávovité až široce kopinaté, ploché nebo žlábkovitě prohnuté listy, někdy s vroubkovaným okrajem. Bezlistý květní stonek je ukončen hustým hroznovitým květenstvím válcovitého nebo kuželovitého tvaru. V květenství se často objevují jak plodné, tak sterilní květy odlišné barvy. Jednotlivé kvítky mívají soudečkovitý až trubkovitý tvar, jsou tvořeny srostlými květními plátky nejčastěji modré barvy.
Kořen	Svazčité vyrůstající z podpučí cibule.
Pupeny	Obnovovací pupeny jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Listy úzké trávovité.
Květenství	Bezlistý květní stonek je ukončen hustým hroznovitým

květenstvím válcovitého nebo kuželovitého tvaru. V květenství se často objevují jak plodné, tak sterilní květy odlišné barvy.

Jednotlivé kvítky mívají soudečkovitý až trubkovitý tvar, jsou tvořeny srostlými květními plátky nejčastěji modré barvy.

Květy	Modré a u odrůd i bílé
Plody	Plodem je tobolka.
Semena	Černá drobná.
Vytrvalost	Na vhodném stanovišti je dobře vytrvalý.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Použití	Díky výrazně modré barvě květů jsou modřence ideální na výsadby do skupin s ostatními na jaře kvetoucími cibulovinami především s narcisy a žlutě a oranžově kvetoucími tulipány. Je možné z nich vysadit i obruby záhonů, kombinovat je s trvalkami, nechat je zplanět v trávníku i pod skupinami dřevin. Používají se také k výsadbám do nádob, k rychlení a vyšší druhy k řezu květů. Ve váze mají dobrou trvanlivost.
Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.

Množení

Množení - poznámka	Většina druhů se snadno množí dceřnými cibulkami. Možný je i výsev semen, semenáčky vykvétají za 3-4 roky. Protože se jednotlivé druhy mezi sebou snadno kříží, často vykazují semenáčky jiné vlastnosti než mateřská rostlina.
--------------------	---

Grafické přílohy

