

# Taxon *Vitis vinifera* Rulandske modre

Název taxonu	Vitis vinifera Rulandske modre
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Rulandské modré´ (RM)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Pinot noir, Blauburgunder, Roučí modré, Burgundské modré
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda pocházející pravděpodobně z Francie; pravděpodobný kříženec ´Mlynářky´ a ´Tramínu červeného´

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, většinou třílaločnaté s mírnými až středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený, někdy překrytý; povrch listu je tmavě zelený, lehce vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, hustý, válcovitý hrozen; bobule malá až středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Rulandské bílé´ a ´Rulandské šedé´ od kterých se liší barvou bobulí (modrá, ojíňená)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	suché i příliš vlhké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží, půdy s vyšším obsahem vápníku příznivě podporují tvorbu aromatických látek

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C

## Užitné vlastnosti

---

Použití	modrá moštová odrůda - výroba růžového a červeného vína, sekty
Choroby a škůdci	citlivá zejména na houbové choroby
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 7-11 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy	klony PO-20, PO-22
Popis vína	víno je světle granátové až cihlové barvy, chuti jemně hořkomandlové až po sušené švestky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, barrique, sekty

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 114)</a></li></ul>
--------------------------	---

## Ostatní

---

Stáří vzorku	6 let
Výsev/výsadba na stanoviš...	2006

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

