

Taxon Vitis vinifera Cerason

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | Vitis vinifera Cerason |
| Vědecký název taxonu | Vitis vinifera |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Linné |
| Odrůda | ´Cerason´ (Ce) |
| Český název | Réva vinná pravá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Mi-5-100 |
| Autor | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Vnitrodruhové jednotky | vinifera |
| Nadřazená kategorie | Vitis |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|---|
| Biogeografické regiony | Kulturní původ |
| Biogeografické regiony - po.. | jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Merlan´ x ´Fratava´ |

Zařazení

| | |
|----------------------|----------------|
| Fytcenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina | Mošťová odrůda |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------------|--|
| Habitus | středně bujný až bujný růst |
| Výhony | jednoleté réví silné, červenohnědé, dobře vyžrávající |
| Pupeny | středně velké, zašpičatělé |
| Listy | středně velké, slabě troj až pět ilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený až lehce překrytý; povrch listu je tmavě zelený, jemně vrásčitý |
| Květenství | lata |
| Květy | oboupohlavné, pětičetné |
| Opylovací poměry | Samosprašná |
| Plody | středně velký, kuželovitý hrozen, často s křídélkem, poměrně hustý; bobule je malá až střední, kulatá, modročerná |
| Semena | středně velká, hruškovitá, zobáček je krátký |
| Kůra a borka | šedé barvy, odlupuje se v pásech |
| Vytrvalost | ano |
| Dlouhověkost | ano |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení | Červen |

Doba zrání

| | |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Říjen |
| Konec doby zrání | Říjen |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla | teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá |
| Faktor vody | nevadí i sušší, písčité a kamenité půdy |
| Faktor půdy | hlinité, hlinitopísčité půdy |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |
| Faktor půdy - poznámka | ovlivňujeme podnoží |

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

| | |
|-----------------|---|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení |
| Řez | na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez |
| Podnož | doporučovány jsou podnože SO 4, CR 2 a Kober 125 AA |

Užitné vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Použití | modrá moštová odrůda - výroba červeného vína |
| Choroby a škůdci | odolná k houbovým chorobám, citlivější k plísni šedé |
| Plodnost | pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha) |

Množení

| | |
|-----------------------------|---|
| Množení | Roubování |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací |
| Popis vína | víno výrazně tmavě červené barvy, odrůdové ovocné vůně a kořenitá chuť připomínající černé třešně |
| Doporučená technologie vína | jakostní a přívlastková červená vína, barrique |

Celky sbírek

| | |
|--------------------------|---|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 103) |
|--------------------------|---|

Ostatní

| | |
|--------|---|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf |
|--------|---|

Grafické přílohy

