Taxon Vitis vinifera Sylvanske zelene

Název taxonu	Vitis vinifera Sylvanske zelene
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Sylvánské zelené´ (SZ)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	Silvaner, Grüner Silvaner, Zöld silvani, Zelený Cinyfál
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patrně rakouská odrůda, pravděpodobně vznikla nahodilým křížením odrůd ´Tramín červený´ x ´Rakouské bílé (Österreichisch Weiss)´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, občas hůře vyzrává
Pupeny	malé, zahrocené
Listy	středně velké, okrouhlé, lehce třílaločné, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je slabě vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě válcovitý hrozen, hustý, s krátkou stopkou; bobule je kulatá, středně velká, zelená až zelenožlutá, tečkovaná
Semena	malá až středně velká, elipsoidní, zobáček je rovný a tupý
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano

Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední
Faktor vody	nevhodné jsou i sušší a kamenité půdy a půdy s vyšším obsahem vápníku
Faktor půdy	humóznější hlinitopísčité a hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na hlubokých úrodných půdách SO 4 či CR 2, na lehčích Kober 125 AA i Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	citlivá k houbovým chorobám, zejména na padlí révové
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Odrůdy	klony Zn-1/54, KA-38/23, KA-46/21, KA-60/25, KA-62/23, KA-64/14
Popis vína	víno má svěží kyselinu, ovocně kořenitou vůni a chuť, později až florální tóny po akátu či angreštu
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- V / ZF - V - vinice (řádek 99)

Grafické přílohy