

Taxon Agrimonia procera

Název taxonu	Agrimonia procera
Vědecký název taxonu	Agrimonia procera
Jména autorů, kteří taxon p...	Wallr.
Český název	řepík vonný
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Agrimonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. není dobře znám

Zařazení

Pěstitelská skupina Trvalka zatahující a Léčivá rostlina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	lodyha větvená, tupě hranatá až oblá, 0,5 - 2 m, žláznatě chlupatá, se dvěma typy chlupů
Kořen	větvený oddenek
Listy	přetřhaně lichozpeřený, okraj lístků pilovitý, čepel na rubu chlupatá
Květenství	vrcholový přímý klas
Květy	žluté, 5četní, plátky vykrojené
Plody	češule zvonkovitá, do 1/2 mělce a široce brázditá, štětiny jsou dolů skloněné

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červen

Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	snáší částečné zastínění
Faktor půdy	na nevápených podkladech

Užitné vlastnosti

Použití LAKR

Doporučený spon pro výsad.. řádky 0,45 - 0,6 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(záhon LAKR\)](#)