

Taxon Juglans regia

Název taxonu	Juglans regia
Vědecký název taxonu	Juglans regia
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	ořešák královský; ořešák vlašský
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Juglans

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina Listnatý strom opadavý
Životní forma Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom 15-25 m vysoký, koruna vejčitě kulovitá, koruna řidší, široce rozkladitá
Výhony	letorosty hnědé, lysé
Pupeny	střídavé
Listy	lichozpeřené, 20-40 cm dlouhé, ze 7-9 elipčitých, lysých, celokrajných lístečků, eliptických, podlouhlých až obvejčitých, 5-15 cm dlouhých, koncový obvykle zřetelně větší
Květenství	samčí v tlustých jehnědách, samičí ve svazcích
Květy	nevýrazné; samčí jehnědy 5-10 cm dlouhé, samičí květy po 2-5 kusech
Plody	peckovice po 1 - 5 kusech, 4-7 cm dlouhé, dužnatý obal nepravidelně praská a ořech vypadává, ořechy kulovité 3-5 cm dlouhé, skořápka světle hnědá, mělce vrásčitá, se 2 lištami, jedlý
Kůra a borka	světle popelavě šedá, ve stáří podélně rozpraskaná borka
Možnost záměny taxonu (+..	Od ostatních druhů Juglans a rodu Carya se liší celokrajnými lysými listy
Dlouhověkost	středněvěký
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	ořechy sbíráme v září až říjnu
-----------------------	--------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	stanoviště slunné a chráněné proti severním větrům
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblasti I-II, trpí na velmi silné zimní mrazy nebo pozdní jarní mrazíky
Faktor vody	preferuje vlhké půdy, snese sucho
Faktor půdy	hluboké, dobře provzdušněné, živné půdy, zasadit é
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	nesnáší půdy těžké, mělké, trvale zamokřené nebo naopak příliš suché

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	v zahradních úpravách pěstovaný většinou jako ovocná dřevina

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka	semenáčky jsou na mráz velmi choulostivé, roubování je dosti obtížné, přesazovat jej je možné jen v mládí
Odrůdy	‘Laciniata’ - stříhanolistý kultivar, téměř nepěstovaný

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)