

Taxon *Laburnum anagyroides*

Název taxonu	Laburnum anagyroides
Vědecký název taxonu	Laburnum anagyroides
Jména autorů, kteří taxon p...	Medik.
Český název	štedřenec obecný, štedřenec odvislý
Synonyma (zahradnický pou..	L. vulgare Berchtold & J. Presl
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Laburnum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	střední a jižní Evropa

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř nebo stromek
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř nebo stromek, výška 5-9 m, koruna rozkladitá
Výhony	letorosty šedo zelené a bíle přitiskle chlupaté
Pupeny	pupen střídavý bez krycích šupin
Listy	listy 3četné, lístky jsou eliptické až obvejčité, 3-8 cm, na rubu šedo zelené a přitiskle chlupaté, řapík 2-6 cm
Květenství	nící a řdké hedvábité hrozny, 10-30 cm, se 14-25 kěty
Květy	květy světle žluté nebo zlatožluté, nevonné, asi 2 cm, pavéza na bázi nahnědlá
Plody	lusky 4-8 cm, hedvábně chlupaté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný

Faktor tepla	teplomilný, oblast I-II
Faktor vody	suchovzdorný
Faktor půdy	nenáročný, vápnomilný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ
Použití	solitéra, okraje skupin, celá rostlina je jedovatá!

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	v případě roubování používáme jako podnož semenáč, který mimo jiné může sloužit i jako podnož pro Cytisus