

Taxon *Lagenaria siceraria*

Název taxonu	<i>Lagenaria siceraria</i>
Vědecký název taxonu	<i>Lagenaria siceraria</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Molina) Standley
Český název	tykev lahvovitá, lagenárie
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Lagenaria vulgaris</i>
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lagenaria

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. jižní a jihovýchodní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár... teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	popínavá
Kořen	mohutná kořenová soustava
Výhony	hrnatá
Listy	srdčité až ledvinité, porostlé hustými trichomy
Květy	jednopohlavní, bílé, jemně vykrajované
Plody	dužnatá bobule různého tvaru a velikosti, pokožka světle zelená až tmavozelená nebo bíle mramorovaná
Semena	podlouhlá, šedavě bílá s vykrajovaným okrajem
Vytrvalost	jednoletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Zář

Doba zrání

Začátek doby zrání Červen
Konec doby zrání Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	optimum nad 20 °C
Faktor půdy	humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí, písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květ ilka všežravá (Hylemyia platura)
Doporučený spon pro výsad..	1 x 1 m po třech až čtyřech semenech

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)

Grafické přílohy



