

# Taxon Clematis ´ Vinne ´

Název taxonu	Clematis ´ Vinne ´
Vědecký název taxonu	Clematis
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Charles Noble</a>
Odrůda	´ Vinne ´
Český název	plamének
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ranunculaceae</a>

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2 m, popínavý
Výhony	tenké, hnědé, plstnatě chlupaté, hranaté, starší lysé, internodia dutá, starší dřevo na příčném řezu nápadně pórovité
Pupeny	vstříčné, malé, kuželovité, hustě bíle plstnaté, umístěné těsně pod ovíjivým vytvářejícím řapíkem
Listy	řapíkaté, lichospeřené, po 3 -5 lístků, s úponkovitými řapíky
Květenství	laty
Květy	červené barvy se světlými tyčinkami, v průměru 15 cm velké
Plody	nažka s pérnatou čnělkou
Kůra a borka	hnědá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

## Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilný,
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný, vyžadují však přistínění kořenů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 5 -

Faktor vody	vlhko, ne však příliš zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, vhodné jsou živné, ne těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez	kvete na bočních vyýhonech loňského dřeva, a na konci léta na vrcholech nových výhonů, proto na začátku jara ponechat jen silné výhony seříznuté k páru silných pupenů
-----	--

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetickéh...	léto - výrazné květy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, trvalkové záhony, vyžaduje oporu
Choroby a škůdci	Vadnutí Plaménku ( <i>Phoma clematidina</i> ): Rychlé odumírání listů, celých výhonů i rostlin. Padlí ( <i>Erysiphe polygoni</i> ): Bělavý povlak na listech měkkých výhonech i květech. Plíseň šedá ( <i>Botrytis cinerea</i> ): Poupata, květní stopky i stonky hnědnou, hnědý povlak plísně. Antraknoza Plaménku ( <i>Matssonina clematidis</i> ): Tmavěhnědé až černé skvrny často se šíří od čepele až podél středu listu. Mšice, Slimáci.

## Množení

---

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary rodu <i>Clematis</i> řízkování zelenými řízkami, na řízku ponecháváme min. 1 pár listů, řízky s bočním poraněním, méně rozšířenou metodou je robování, jako podnože je možno využít <i>C. viticella</i> L. eventuelně <i>C. vitalba</i> L.

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.clematisinternational.com">http://www.clematisinternational.com</a></li> <li>• <a href="http://www.guernsey-clematis.co.uk">http://www.guernsey-clematis.co.uk</a></li> </ul>

- <http://www.parkon.cz>
- <http://www.databaze.dendrologie.cz>
- <http://www.clematis.hull.ac.uk>