

# Taxon *Asplenium antiquum*

Název taxonu	<i>Asplenium antiquum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Asplenium antiquum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Makino (1929)</a>
Český název	sleziník
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Neottopteris antiqua</i> (Makino) Masam.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Neottopteris</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, ostrovy Riukiu, Taiwan

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Epifyt
Životní forma - poznámka	v tropech epifytické, v kultuře možno pěstovat i terestericky

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	bazální listová růžice, široce nálevkovitá, výška cca 30-40 cm
Kořen	krátký vzpřímený oddenek, pokrytý na povrchu černými plevinami
Listy	jsou zřetelněji řapíkaté než u <i>A. nidus</i> , celistvé, kopinaté, 50-80 cm dlouhé, celokrajné, na vrcholu výrazněji špičaté a se silně zvlněným okrajem; žilnatina je tvořena souběžnými postranními žilkami;
Semena	výtrosy; kupky výtrusnic jsou natěsnané do čárkovitých útvarů, lemujících postranní žilky a začínají cca 5 mm od středního nervu; nezralé výtrusnice jsou kryty později zasychající ostřou, která je dvakrát širší než u <i>A. nidus</i> .

Možnost záměny taxonu (+.. *A. nidus* - větší vzrůst, nezvlněný okraj listu.

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	stanoviště s rozptýleným světlem; nesnáší přímé slunce
Faktor tepla	teplý skleníkový; v létě 18-20°C, přes zimu minimální teploty 14-16°C
Faktor vody	vyžaduje vyšší půdní i vzdušnou vlhkost;
Faktor půdy	živný a lehký substrát, s přidavkem rašeliny; pH 4,5 - 6,0

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	leden - prosinec
Použití	solitéra pro epifytní kmeny a pro podrosty teplých skleníků; při zvýšené péči (vyšší vzdušná vlhkost) lze omezeně pěstovat i v otevřeném interiéru (koupelny, kuchyně).
Choroby a škůdci	kořenové mšice, puklice

## Množení

---

Množení	Generativní a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	rodozměna: výsev výtrusů - prothalamium - oplození - mladé rostliny
Odrůdy	‘Osaka’ - kompaktní listová růžice s černým středem, mladé listy jsou silně zvlňené, matně zelené s lehkým leskem; ‘Victoria’ - vzrůstný kultivar se silně zvlňeným okrajem listu

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/26603318?tab=references>

## Grafické přílohy

---

