

# Taxon Vitis vinifera Frankovka

Název taxonu	Vitis vinifera Frankovka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Frankovka´ (Fr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Blaufränkisch, Blauer Limberger, Lemberger, Širokolistýj, Kék Frankos, Crna Moravka
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	velmi stará odrůda, dle některých pramenů pochází z Německa či Rakouska popř. Chorvatska; spontánní kříženec odrůdy ´Heunisch weiss´ s doposud nezjištěnou odrůdou

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je světle červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, široké, špičaté
Listy	velké, jemně trojlaločné až celistvé, bazální výkroj je tvaru písmene V, mírně otevřený; povrch listu je tmavě zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modré barvy
Semena	středně velká, hruškovitá až elipsoidní, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Říjen  
Konec doby zrání Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění  
Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy  
Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení  
Řez na dlouhý tažeň  
Podnož doporučovány jsou podnože SO 4, T 5C a CR 2

## Užitné vlastnosti

---

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína  
Choroby a škůdci náchylná k houbovým chorobám  
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  
Odrůdy klony PO-22/4, PO-275/5i, PO-281/E, PO-271/B, VP-6/5, VP-14/4, VP-11/3  
Popis vína víno je tříslonité, odrůdové chuti ovocného charakteru po višních, skořici a hořké čokoládě  
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, rosé

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 89, 115\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

