

Taxon *Ceratostigma plumbaginoides*

Název taxonu	Ceratostigma plumbaginoides
Vědecký název taxonu	Ceratostigma plumbaginoides
Jména autorů, kteří taxon p...	Bunge (1933)
Český název	olověnec
Synonyma (zahradnický pou..	Plumbago larpentae Lindley; Valoradia plumbaginoides (Bunge) Boissier.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ceratostigma

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Čína - Beijing Shi, Henan, Jiangsu, Shanxi, Zhejiang

Zařazení

Fytocenologický původ	skalnatá stanoviště - často na úpatí svahů , v keřových porostech
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina 20-30 (60) cm vysoká, tvořící souvislé porosty
Kořen	větvený, hnědě šupinatý oddenek 2-3 mm v průměru
Výhony	slabé, jednoduché nebo rozvětvené lodyhy vystoupavé až vzpřímené
Listy	střídavé, široce kopinaté až kopinaté, (2--)4--6(--10) X (0.8--)2--3(-5.3) cm velké, krátce na špičce zašpičatělé ; okraj čepele s brvami, povrch čepele obvykle lysý, s roztroušenými štět inami, tmavě zelený
Květenství	terminální nebo laterální 15-30 květ é hlávky složené z dvoukvět ých klásků.
Květy	oboupohlavné, pravidelné. Kalich trubkovit ý s 5 zuby, obvykle průsvitný, purpurově naběhlý. Koruna 25-30mm v průměru, s úzkou dlouhou trubkou a s 5-ti plocho rozloženými, mělce vykrajovanými cípy, ukončenými tenkým hrotem. Barva koruny azurově modrá až červeně nachová. 5 tyčinek, které nevyčnívají z trubky.
Plody	tobolka

Semena	kulatá, červeno hnědá
Vytrvalost	vytrvalá, zatahující
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	velmi pozdně rašící taxon

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	cenná pro pozdní kvetení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	u nás ne zcela mrazuvzdorný, vhodná zimní ochrana (chvojí, listí atd.)
Faktor vody	standardní, zahradní půda; nesnáší extrémní sucho ani zamokřené půdy
Faktor půdy	propustné, mírně humózní i chudší půdy
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné ph

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době kvetení na podzim, kdy současně nádherně vybarvují listy do oranžovo červené barvy
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	půdopokryvná trvalky
Růstové i jiné druhově spec..	na příznivých stanovištích se může silně rozrůstat
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dělení trsů
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 10: záhon u zadního vchodu budovy D - u... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Ostatní

Stáří vzorku D10: podzim 2014

Grafické přílohy

